

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-11-85596550

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Circonscription
PROVENCE, ALPES, CÔTE D'AZUR, CORSE
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 BORGIO -

(95) 36.05.70



Edition Speciale Corse

Bulletin Technique n°68

du 19 Novembre 1985

- : - Pluies intermittentes : risques de mildiou sur salades :
- : - le desherbage de post-levée du colza :
- : - N'oubliez pas le traitement d'automne sur les pêchers :
- : et amandiers :

LAITUES - SCAROLES

Surveillez vos plantations, les risques de maladie augmentent.

*** Utiliser contre le mildiou des produits à base de mancozèbe, manèbe, zinèbe
ou Cymoxanil + mancozèbe : FULVAX, REMILTINE
phosethyl al + mancozèbe : RHODAX

*** Utiliser contre le botrytis des produits à base de

Folpel
Iprodione
Procimidone
Vinchlozoline

NS
KIDAN, ROVIAL
SUMISCLEX
RONILAN

Ne pas utiliser ces deux derniers produits sur jeunes plantations ou en mélange
avec un insecticide car il y a risque de phytotoxicité

: l'emploi du thirame après plantation:
: est désormais interdit :

: Arrêter tout traitement au :
: stade 15 - 17 feuilles :
: :

COLZA

Les semis ont été difficiles en raison de la sécheresse puis des abondantes
précipitations - le desherbage en pré - semis n'a pas toujours pu être effectué
Un certain nombre de matières actives peuvent être utilisées en post-levée :

P27

: PRODUIT :	: ACTION sur :	: OBSERVATIONS :
: COMMERCIAL :	: Graminées : Dicotylédones :	
: KERB 50 W :		
: 1,5 kg :	: insuffisant :	* Application en hiver sur colza
: LEGURAME PM :		: bien enraciné
: 3 kg :		
: PRADONE TS :	Bonne	: laiterons : * à partir du stade 4 feuilles
: 3,5 kg :		: stellaires :
:		: lamiers : * appliquer sur végétation active
:		: Véroniques :
: KERB ULTRA :		: sanves : * à partir de la 6 ^{ème} feuille
: 1,2 kg :		: Ravenelles : naissante - avant hiver, sur
:		: colzas bien implantés
: LONTREL SF 100 :	X	: Anthémis : * quel que soit le stade du colza
: 1 l :		: Matricaires : * appliquer à température > à 10 °
:		: qq légumineuse
: FERVIN :	X	
: 1 kg (vivaces :		
: 1,5) + 3 l huile :		
:		
: FERVINAL :		: * quel que soit le stade du
: 1,5 à 1,75 kg :		: colza
: + 3 l huile :		: * de la levée à début montaison
:		: des graminées
: FUSILADE X 2 :		: * traiter sur végétation active
: 0,7 l (vivaces :		
: 1,5) + Agral :		
: (0,1 %) ou :		
: Actiplus :		
:		
: TARGA :		
: 1,25 l (vivaces 3 :		
: + 2 l huile :		
:		
:		

Surveillez les **limaces**
 Detectez leur présence avec des
 granulés placés sous des tuiles

Mettez en place les cuvettes
 jaunes pour capturer les **altises**

ARBRES FRUITIERS :

Ne négligez pas le traitement cuprique d'automne (500 g de cuivre métal/hl) sur pêcher et amandier.

Vous avez peut-être constaté des attaques de fusicoccum (apparition de chancres au niveau des bourgeons, puis dessèchement des rameaux, exsudation de gomme) Protégez les arbres pendant la chute des feuilles en effectuant également deux traitements à base des matières actives : benomyl, carbendazime ou thiophanate methyl.